

عوارض جانبی:

عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند:
 ویتامین D: دردهای استخوانی، یبوست، اسهال، تکرر ادرار، گیجی و خواب آلودگی، تهوع، طعم فلزی در دهان و مشکلات قلبی عروقی.
 ویتامین A: مصرف بیش از حد ویتامین A می تواند منجر به یرقان، تهوع، از دادن اشتها، تحریک پذیری، استفراغ و حتی ریزش مو شود.
 ویتامین K: سردرد، سرگیجه، حرکات تشنجی، نبض سریع و ضعیف، آریتمی قلبی، بثورات آلرژیک، خارش، کهیر، تعریق، برافروختگی، اریتم، تهوع، استفراغ.

هشدارها:

مکمل های ویتامین A در صورت وجود هیپرویتامینوز، اکیدا نباید مصرف شود.

شرایط نگهداری:

- دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
 - دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 - پس از هر بار مصرف درب بطری ببندید و داخل جعبه قرار دهید.

بسته بندی:

قطره خوراکی پدیا آ.د.پلاس کا در شیشه های قهوه ای ۳۰ میلی لیتری با درپوش پلاستیکی و قطره چکان مدرج، داخل جعبه ارائه می گردد.

این فرآورده صرفا مکمل رژیمی - غذایی بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی باشد.

قطره خوراکی پدیا آ.د.پلاس کا حاوی ویتامین A، ویتامین D₃ و ویتامین K₂ (MK7) می باشد که با طعم مطلوب شیر برای مصرف در نوزادان و کودکان تهیه شده است.

ترکیبات:

هر یک میلی لیتر حاوی:
 ویتامین A: ۱۵۰۰ واحد بین المللی.
 ویتامین D₃: ۶۰۰ واحد بین المللی.
 ویتامین K₂ (MK7): ۲ میکروگرم.

مواد جانبی:

پلی سوربات A^{۸۰}، متیل پارابن، پروپیل پارابن، پروپیلن گلیکول، سوربیتول، گلیسرین، طعم دهنده.

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- حساسیت به هر نوع ویتامین و رنگ
 - وجود هر نوع بیماری خصوصی
 - بیماری کبدی
 - هیپاتیت ویروسی
 - موارد هایپرویتامینوز
 - نقص فعالیت قلبی
 - هایپرفسفاتی
 - مشکلات مزمن کلیوی
 - موارد حساسیت به ویتامین آ، ویتامین D₃ و ویتامین K₂
 - در صورت مصرف داروهایی نظیر ایزوترتینوئین، تتراسایکلین، ویتامین E، داروهای آنتی اسید و فرآورده های حاوی کلسیم با احتیاط مصرف شود.

موارد مصرف:

- کمک به تامین ویتامین A، ویتامین D₃ و ویتامین K₂ مورد نیاز نوزادان و کودکان
 - رشد، شکل گیری و تقویت استحکام استخوان ها
 - تقویت قدرت عضلانی
 - سلامت بینایی
 - کمک به افزایش اشتها
 - رشد همه بافت های بدن

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف این فرآورده برای کودکان زیر ۴ سال از طریق خوراکی به میزان یک میلی لیتر روزانه، طبق تجویز پزشک معالج است.

موارد احتیاط:

طبق دستور پزشک یا مقادیر توصیه شده مصرف گردد و از مصرف بیش از اندازه خودداری گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

ویتامین A در بارداری در گروه X طبقه بندی شده است و نباید در دوران بارداری مصرف گردد ولی در خصوص مصرف آن در دوران شیردهی مشکلاتی گزارش نشده است.
 ویتامین D در بارداری در گروه C طبقه بندی شده است و در شیردهی مطالعات چندانی بر روی آن صورت نگرفته است.
 ویتامین K در بارداری در گروه C (در سه ماهه سوم بارداری گروه X) طبقه بندی شده است.
 ویتامین K در شیر ترشح نمی شود و با مصرف این دارو هیچ گونه مشکل بالینی در دوران شیردهی گزارش نشده است.